



H. HARTZIEKENHUIS
MOL

Ontslagbrochure
Moederhuis

WELKOM
BIJ HET
H. HARTZIEKENHUIS
MOL

Hoofdvroedvrouw: Inge Geebelen
Tel.: 014 71 28 99
E-mail: inge.geebelen@azmol.be

INHOUD

Hygiënische verzorging: eigen hygiëne	5
Medicatie	6
Wanneer contact opnemen met de huisarts/kinderarts?	7
Verzorging baby	8
Wanneer contact opnemen met de huisarts/gynaecoloog?	12
Apotheek	15
Ontslagcriteria na bevalling	17
Zelfstandige vroedvrouwen	19
Nuttige adressen en telefoonnummers	20
Bijlage: thuiszorg door de zelfstandige vroedvrouw	21

Beste ouder(s),

Hartelijk gefeliciteerd met de geboorte van uw kindje(s). Binnenkort gaat u naar huis. Daarom willen we nog wat handige tips en informatie meegeven om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Wij wensen u heel veel succes!

Het moederhuis-team

HYGIËNISCHE VERZORGING: EIGEN HYGIËNE

Bloedverlies

U kan tot 6 weken na de bevalling bloedverlies hebben. Dit is enkel de eerste week helderrood, daarna wordt dit bruin. Het bloedverlies is min of meer geurloos. U mag geen grote bloedklonters verliezen. Een kleine bloedklonter de eerste week na de bevalling is normaal.

Hygiëne

U mag na de bevalling al meteen douchen. U kunt best de schaamstreek goed spoelen met water. Een ph-neutrale zeep mag ook gebruikt worden.

Borsten

Indien u borstvoeding geeft en u heeft stuwings, kan u de stuwings verlichten door een coldpack te gebruiken na de voeding en een hotpack te gebruiken vlak voor de voeding. U kan de spanning verminderen door een beetje manueel te kolven, zodat de baby gemakkelijker kan aanhappen. Eventueel kan u maximum 1x per dag machinaal kolven, wanneer de spanning niet verminderd is na een voeding.

Een griepig gevoel tijdens de stuwings is niet abnormaal. U mag hiervoor een pijnstiller nemen (Paracetamol zoals Dafalgan 1g forte, ... - Ibuprofen zoals Nurofen 400mg, Ibuprofen 400 mg, ...). De stuwings kan ongeveer een 3-tal dagen aanhouden. U wast de borsten best niet met zeep, maar met water. Zeep droogt de huid uit en kan een andere smaak geven aan de tepel.

Aambeien

Indien u last heeft van aambeien, wordt er meestal reeds op onze afdeling gestart met een behandeling (zalf en/of medicatie). Wanneer u naar huis gaat, kan deze behandeling op doktersadvies worden verder gezet. Indien de aambeien pas ontstaan na uw ontslag uit het ziekenhuis, kan u best uw huisarts of vroedvrouw contacteren. Probeer te zorgen voor een vlotte stoelgang door voldoende water te drinken en vezels te eten.

MEDICATIE

Anticonceptie

De gynaecoloog zal tijdens het ontslaggesprek op de laatste dag van uw verblijf in het ziekenhuis de anticonceptie met u bespreken. Er zijn verschillende mogelijkheden: condoms, anticonceptiepil, spiraal,.... Indien u borstvoeding geeft, en u kiest voor een hormonale anticonceptiemethode, is het aangewezen om de minipil te nemen. De gynaecoloog zal op dat moment de nodige voorschriften schrijven en de opvolging met u bespreken. De minipil mag gestart worden vanaf het moment dat uw kindje 3 weken oud is en de borstvoeding goed op gang is. De gewone anticonceptiepil (indien u flesvoeding geeft) mag gestart worden vanaf 2 weken na de bevalling.

Er wordt een nacontrole gepland bij de gynaecoloog, ongeveer 6 weken na uw bevalling. U dient hiervoor een afspraak te maken bij uw gynaecoloog (zie "nuttige adressen en telefoonnummers").

U mag terug betrekkingen hebben vanaf 4-6 weken na de bevalling. Het belangrijkste is dat u zich hier klaar voor voelt. Het is mogelijk dat u de eerste maanden na de bevalling, vooral in de periode dat u borstvoeding geeft, een glijmiddel nodig heeft. U kan dit verkrijgen bij de apotheek, de supermarkt,...

OPGELET: Indien u borstvoeding geeft, is uw vruchtbaarheid verminderd, maar kan u wel zwanger worden.

Obstipatie

Movicol zakje: 2x/d 1 zakje oplossen in een glas water (vrij verkrijgbaar bij de apotheek). Wij adviseren echter om in de eerste plaats uw voeding aan te passen met vezelrijke maaltijden (bv. bruin brood, voldoende groenten en fruit, ...), voldoende water drinken, ...

Pijnstilling:

- Paracetamol zoals: Dafalgan 1g forte (vrij verkrijgbaar bij de apotheek),
- Ibuprofen zoals: Nurofen 400 mg, Ibuprofen 400 mg,... kan u zonder voorschrift verkrijgen in de apotheek. Deze werken ontstekingsremmend en pijnstillend.

WANNEER CONTACT OPNEMEN MET DE HUISARTS/GYNAECOLOOG?

U kan het best contact opnemen met een dokter indien u één of meerdere van onderstaande klachten ondervindt:

- meer bloedverlies en/of bloedklonters;
- slecht ruikend verlies;
- aanhoudende of toenemende pijn in de onderbuik of aan de hechtingen;
- koorts: temperatuur vanaf 38°C;
- een borstontsteking;
- plots optredende roodheid of pijn bij spataders.

VERZORGING BABY

Handhygiëne

Uw eigen handen zijn vaak een bron van ziektekiemen. Zorg er voor dat u na het verluieren, het snuiten van de neus, een toiletbezoek, ... de handen goed wast.

Luier

Vervang de luier van uw baby elke voeding en zeker bij iedere ontlasting. Zorg ervoor dat de billetjes goed proper en droog zijn, anders kan dit zorgen voor irritatie. Wanneer u merkt dat de billetjes heel rood zijn, kan u de vochtige doekjes vervangen door een tissue met lauw water of amandelolie.

Oogjes

U kan de oogjes reinigen met een gaasje en fysiologisch water (verkrijgbaar bij de apotheek). Wrijf met het doekje van de buitenkant van de oogjes naar de binnenkant toe (van de zijkant van het oog naar de neus toe). Wanneer de oogjes veel vocht afscheiden, kan het traankanaaltje verstopt zijn. Masseer hiervoor lichtjes de binnenkant van het oogje. Indien de oogjes ontstoken zijn en er geen beterschap optreedt na 5 dagen kan u best contact opnemen met de huisarts/kinderarts.

Oren

Oorsmeer heeft een reinigende functie voor het oor. Een oorstokje kan het trommelvlies beschadigen en kan u best niet gebruiken. U kan de oorschelp reinigen met een vochtig doekje of compresje.

Nagels

De nageltjes van uw baby kunnen pas geknipt worden vanaf 4 à 6 weken na de bevalling. Vroeger mag dit zeker niet omdat ze kunnen ontsteken. Gebruik een schaar met stompe punten en ontsmet dit op voorhand.

Neus

U kan het neusje proper maken met een opgerold gaasje of een wattenstaafje. U moet steeds een nieuw proper gaasje gebruiken. Eventueel kan u spoelen met fysiologisch water (verkrijgbaar bij de apotheek). Gebruik nooit op eigen initiatief een neusspray of neusdruppels.

Navel

De navelstomp valt meestal af binnen de 15 dagen na de geboorte. Het litteken dat overblijft is de navel. Zorg ervoor dat u de navel goed droog houdt. Wanneer deze vochtig blijft kan de navel gaan ontsteken.

Temperatuur

Bij kinderen wordt de temperatuur rectaal gemeten, een normale lichaamstemperatuur ligt tussen 36.5 en 37.5° C. Vanaf 38° C heeft uw baby koorts (zie “Wanneer contact opnemen met de huisarts/kinderarts” voor meer informatie).

Badje

U hoeft uw kindje niet elke dag van kop tot teen met zeep te wassen. Zeep kan de huid uitdrogen en irritatie veroorzaken. Gebruik enkel zeep bij zichtbaar vuil zoals stoelgang. Doe indien nodig olie in het badje. Het tijdstip van het badje is niet zo

belangrijk, dit kan zowel 's morgens als 's avonds. Maar u doet dit best niet vlak na een voeding.

Laat uw kindje nooit alleen op het verzorgingskussen liggen! In het begin kunnen baby's nog niet veel zelf bewegen, maar voor u het weet rollen ze van het kussen als u even niet in de buurt bent.

Zorg ervoor dat het water op lichaamstemperatuur is, d.w.z. ongeveer 36 à 37° C. Dit is de meest aangename temperatuur voor de baby. U kan een badthermometer gebruiken, maar controleer het water altijd even met uw elleboog (niet met uw hand). De temperatuur in de badkamer is ideaal rond 22 à 24° C. Laat de baby niet te lang in bad, want het water koelt snel af. Laat uw baby nooit alleen in bad liggen!

Houding

Om te voorkomen dat uw baby een voorkeurshouding gaat ontwikkelen, kan u de volgende tips in acht nemen.

Bij ruglig: Leg het verzorgingskussen in de lengte voor u, zodat uw baby vanuit de middellijn naar u kijkt. Draai het hoofdje van uw kindje afwisselend naar links en naar rechts. Zo voorkomt u ook een afgeplat hoofdje. Eventueel kan u het bedje ook draaien naar de lichtinval. U kan uw kindje stimuleren om naar de niet-voorkeurskant te kijken, bijvoorbeeld tijdens het voeden.

Als uw baby wakker is, kan u hem dagelijks even op de buik leggen (onder toezicht!). Dit stimuleert de motorische ontwikkeling (hoofdje heffen, handjes naar voor bewegen).

Baby's geboren voor 32 weken zwangerschapsleeftijd, worden best opgevolgd door een gespecialiseerde kinesitherapeut om de motorische ontwikkeling te stimuleren. Bij het ontslag geven wij enkele adressen mee, indien van toepassing.

Inbakeren

Inbakeren betekent dat u uw baby in doeken gaat inwikkelen vanaf de schouders tot de voetjes. Hij/zij vindt dit prettig omdat het geborgenheid en steun geeft. Uw baby kan eenvoudig een bepaalde buiging in het lichaam behouden, die zeer belangrijk is voor de ontwikkeling. Door deze begrenzing voorkomt u overstrekking. Uw baby zal ook minder onwillekeurige bewegingen kunnen maken en minder onrustig zijn, waardoor hij/zij sneller tot rust komt en in slaap kan vallen.

U mag het inbakeren thuis langzaam beginnen afbouwen, zodat uw kindje meer en meer bewegingsvrijheid krijgt en hieraan kan wennen (geen 24u op 24 inbakeren).

Er zijn verschillende redenen om een kind niet in te bakeren, zoals:

- problemen met de ontwikkeling van de heupjes van het kind;
- koorts;
- een dag en nacht na een vaccinatie;
- luchtweginfecties.

Krampen

Wanneer uw kindje last heeft van krampen, kan u zijn houding afwisselen en een buikmassage geven. Dit doet u door middel van uw duim en wijsvinger links en rechts van de navel te plaatsen en zachtjes te masseren. Het hoger plaatsen van uw hand kan druk geven op de lever en kan uw baby als onaangenaam ervaren.

Bij BV kan u als mama ook venkelthee of kamillethee drinken om de krampjes te verzachten.

WANNEER CONTACT OPNEMEN MET DE HUISARTS/KINDERARTS?

Het is aangewezen om een dokter te consulteren, wanneer uw baby:

- bleek of blauw wordt, of het bewustzijn verliest bij het wenen;
- kreunt terwijl hij slaapt of wakker is;
- ten val is gekomen (bv. van de luiertafel);
- een bloedende of slecht ruikende navel heeft of de navel na 5 weken nog niet is afgevallen;
- wit beslag heeft op de tong dat niet weg te wrijven is;
- hoest;
- permanent een verstopte neus heeft;
- braakt of niet wil eten;
- koorts heeft.

Een kind heeft koorts wanneer zijn lichaamstemperatuur 38,5 °C is of meer. Bij een baby jonger dan 3 maanden spreken we al van koorts vanaf 38°C. Koorts is een signaal, geen ziekte! Het is belangrijk na te gaan hoe een kind zich gedraagt, hoe het eruitziet en of er nog andere symptomen zijn. Het is niet altijd nodig om koortswerende middelen aan een kind met koorts te geven. Een kind kan koorts ontwikkelen bij een infectie, een kinderziekte en soms na toediening van een vaccin. Doordat baby's beperkt kunnen zweten, ontwikkelen zij sneller koorts.

Bij koorts is het heel belangrijk om rekening te houden met de leeftijd en de algemene toestand van het kind. Houd extra toezicht!

-
- Houd in het oog hoeveel het kindje juist eet en drinkt.
 - Tel hoeveel natte luiers het kindje heeft.
 - Geef het kind regelmatig kleine hoeveelheden vocht. Is het kindje jonger dan 6 maanden geef dan extra melkvoeding. Leg bij borstvoeding het kind vaker aan. Geef grotere kinderen extra water te drinken.
 - Is de kamertemperatuur zeer hoog, verlaag deze dan wat.

Indien uw kindje jonger is dan 3 maanden en de rectale temperatuur 38° of meer bedraagt, contacteert u best een kinderarts. De contactgegevens kan u terugvinden achteraan dit boekje.

Vanaf de leeftijd van 3 maanden kan u uw huisarts contacteren. Hij/zij zal uw kindje doorverwijzen naar de kinderarts indien nodig.

Gebruik van koortswerende middelen

Geef geen koortswerende middelen zonder advies van een arts bij kinderen jonger dan 3 maanden.

Opgelet!

Geef een koortswerend middel op de juiste manier en geef een correcte dosis. Geef bij voorkeur een siroop waarbij een doseerpipet met aanduiding van het lichaamsgewicht van het kind voorzien is.

Geef een suppo enkel wanneer de toediening via de mond niet mogelijk is (bv. bij braken). Bij gebruik van suppo's is de concentratie van het geneesmiddel in het bloed te wisselend.

Indien vaker een koortswerend middel noodzakelijk is, kan vanaf de leeftijd van 3 maanden paracetamol (Dafalgan® of Perdolan®) afgewisseld worden met ibuprofen (Nurofen® of Perdophen®). Paracetamol max. 4 x per dag, minstens 4 uur tussen, volgens gewicht. Ibuprofen max. 3 x per dag, minstens 6 uur tussen, volgens gewicht.

Acetylsalicylzuur (Asperine®, Aspégic®) is af te raden bij kinderen.

APOTHEEK

Vitamine K

Vitamine K is belangrijk voor de bloedstolling. Een kindje dat pasgeboren is krijgt een beperkte voorraad vitamine K mee van de moeder omdat de placenta deze stof moeilijk doorlaat. Vitamine K komt voor in de voeding (oa groene bladgroenten, melkproducten en vlees) en wordt in de darmen aangemaakt door bepaalde bacteriën. Pas vanaf ongeveer 3 maanden zijn er in de darmen van een baby voldoende bacteriën aanwezig om vitamine K aan te maken. Daarom krijgen alle baby's direct na de geboorte vitamine K toegediend via een inspuiting in de bilspier. Dit zorgt voor een voldoende voorraad gedurende de eerste 3 maanden.

Wat moet u thuis doen : (vroedvrouw vinkt het juiste vakje aan bij ontslag)

- Uw kindje kreeg een inspuiting met vitamine K. U moet geen vitamine K meer geven thuis.
- Uw kindje kreeg de vitamine K niet per inspuiting, maar oraal en u geeft borstvoeding, daarom is het aangewezen om elke week 1 ampul Konakion® te geven aan uw kindje.
 - Voorschriften krijgt u mee om dit bij de apotheek te gaan halen.
 - Elke week 1 ampul optrekken met de spuitjes die in verpakking zitten om dit vervolgens in het mondje van uw kindje te spuiten.
 - Stop als uw kindje 3 maanden oud is of als u eerder zou stoppen met borstvoeding (flesvoeding bevat voldoende vitamine K).

Vitamine D

Vitamine D bevordert de groei en ontwikkeling van het beendergestel. Uw kind kan wel vitamine D aanmaken onder invloed van de zon. Langdurig blootstellen aan de zon is voor andere redenen niet echt optimaal en de gemiddelde pasgeborene komt weinig in contact met de zon. Daarom dient u thuis te starten met het geven van vitamine D aan uw kindje.

Dit is een druppelflesje (D-cure®) dat u **zonder voorschrift kan krijgen bij de apotheker.**

Wat moet u thuis doen : (vroedvrouw vinkt het juiste vakje aan bij ontslag)

- Geef uw kind elke dag 6 druppels D-cure® tot 6 jaar.
U kan de vitaminen rechtstreeks in het mondje druppelen.
- Bij negroïde huidtypes worden 12 druppels D- cure® per dag aanbevolen, ook als er kunstvoeding gegeven wordt, tot het kind 6 jaar oud is.
- Bij ex-prematuren (geboren voor 37 weken) worden 12 druppels D-cure® per dag aanbevolen, ook als er kunstvoeding gegeven wordt. De duur wordt overlegd met de behandelende kinderarts.

Uw kindje drinkt volgende voeding:

Hoeveelheid bij ontslag:

ONTSLAGCRITERIA NA BEVALLING

	In orde	Nvt	
Mama	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Min. verblijf materniteit na de partus: 6u
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Onthaalbrochure materniteit (met contactgegevens afdeling)
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Informatie voeding van de pasgeborene BV: Info geven over hoe je een baby kan aanleggen, hoe frequent en hoe lang dit best kan gebeuren om een optimale productie te verwezenlijken. Uitleggen van verschillende houdingen. Tips om problemen te voorkomen. Hongersignalen van de baby leren kennen. Navragen of patiënte een borstvoedingsbrochure gekregen heeft (tijdens zwangerschap via infosessie, consultatie of tijdens de opname) KV: Welke voeding krijgt de baby, hoe frequent moet de baby eten en welke hoeveelheid drinkt de baby per voeding? + Invullen en toelichten ontslagboekje (hierin staan oa voorschriften over hoe en welke melk bereid moet worden voor de baby)
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Geboorte-aangifte gegeven en toegelicht
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zelfstandige vroedvrouw gecontacteerd voor verdere opvolging thuis
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Info ontslagboekje: vitamine K, vitamine D, soort en bereiding kunstvoeding indien van toepassing, contactgegevens
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Medicatielijst meegegeven (2 X afdrukken, 1 voor huisarts, 1 voor patiënt)
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Voorschriften voor nieuw opgestarte medicatie
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Voorschriften voor thuisverpleging, kinesithérapie
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Attest (en) voor arbeidsongeschiktheid/ vertrouwelijk/ school/ sociaal verlof/ ...
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Verzekeringpapieren
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Overdrachtdocument vroedvrouw meegegeven. Hierop staan gegevens over de arbeid, bevalling, het verloop van de voeding, de evt nog uit te voeren onderzoeken, ...

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Overdrachtdocument huisarts meegegeven. Hierop staan gegevens over de arbeid, bevalling, het verloop van de voeding, de evt nog uit te voeren onderzoeken, ...
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gynaecoloog is langsgeweest en heeft afspraken gemaakt over oa.: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Medicatie die thuis kan of moet worden ingenomen ▪ Over anticonceptie ▪ Evt voorschrift kiné ▪ Controle-onderzoek na 6 à 8 weken bij de gynaecoloog

Baby

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Min. verblijf materniteit na partus: 6u
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bloedafname guthrie en bilirubine werden afgenomen. Indien ontslag gebeurt voordat de baby 48 uur oud is, worden er afspraken gemaakt over wie de bloedafname gaat doen en waar deze zal doorgaan.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Controle pediater (klinisch ontslag) onderzoek. Indien ontslag gebeurt voor dag 3, wordt er een afspraak meegegeven voor een controle onderzoek tussen dag 3 en dag 6, op de materniteit, door de kinderarts.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Formulier voor controle kinderarts/ bloedafname/ RX/ echo/...
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Voorschriften voor medicatie

ZELFSTANDIGE VROEDVROUWEN

Indien u dit wenst, kan u zich thuis nog laten begeleiden door een zelfstandige vroedvrouw. Zij komt bij u langs om de baby te wegen, voor begeleiding van de borstvoeding, om eventuele hechtingen te verwijderen, om uw bloeddruk te controleren, voor advies ,...

U heeft recht op een dagelijks bezoek van de vroedvrouw tot en met de vijfde dag na de bevalling. Nadien heb je nog recht op 7 huisbezoeken. Indien verdere opvolging nodig is, kan dit besproken worden met de vroedvrouw. De kosten worden vergoed door het ziekenfonds, indien de vroedvrouw geconventioneerd is.

Let wel, de zelfstandige vroedvrouw mag een kilometervergoeding en/of een administratieve kost vragen, deze wordt niet terugbetaald door het ziekenfonds en is volledig ten uwen laste.

Indien u dit wenst, kan u de bijlage “Thuiszorg door de zelfstandige vroedvrouw” (achteraan dit boekje) invullen en aan de vroedvrouw op de kraamafdeling bezorgen. Zij zal voor u de gewenste vroedvrouw contacteren.

NUTTIGE ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS

H. Hartziekenhuis Mol - moederhuis

Gasthuisstraat 1, 2400 Mol

www.azmol.be

Tel. materniteit: 014/ 71 21 35

E-mail: materniteit@azmol.be

Hoofdvroedvrouw

Inge Geebelen

E-mail: inge.geebelen@azmol.be

Gynaecologen:

Dr. Muyldermans – Dr. Cochet – Dr. Van Ballaer – Dr. Vermeylen – Dr. Heymans – Dr. Vercammen – Dr. Borowski. Tel. consultatie gynaecologie 014/ 71 28 88 (van maandag tot donderdag bereikbaar van 09u00 – 16u30 en op vrijdag van 09u00 tot 12u00)

Pediaters:

Dr. Givron – Dr. Jeunen – Dr. Van Wesemael – Dr. Dekkers – Dr. Box – Dr. Bernaerts – Dr. Hensels Tel. consultatie pediatrie 014/71 23 73 (elke werkdag bereikbaar van 09u00 - 12u00 en van 13u30 - 17u00)

Kind en Gezin

www.kindengezin.be

Wachtdienst huisarts

www.mediwacht.be

Wachtdienst apotheek

www.apotheek.be

Website en social media

www.moederenkindmol.be

[instagram.com/moederhuismol](https://www.instagram.com/moederhuismol)

BIJLAGE: THUISZORG DOOR DE ZELFSTANDIGE VROEDVROUW

U hebt ervoor gekozen om thuis nog verder begeleid te worden door een zelfstandige vroedvrouw. Gelieve uw voorkeur en enkele gegevens hier onderaan in te vullen. Bezorg dit formulier aan de vroedvrouw op de kraamafdeling en zij zal bij uw ontslag, de vroedvrouw van uw keuze, op de hoogte brengen. De zelfstandige vroedvrouw zal nadien met u contact opnemen om een eerste afspraak te maken.

Ik heb geen voorkeur, u mag een vroedvrouw uit mijn regio contacteren

Ik heb wel een voorkeur

Naam van de vroedvrouw :

Mijn naam:

Mijn telefoonnummer waarop ik bereikbaar ben :

Mijn adres :

.....

Opmerkingen:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....





H. HARTZIEKENHUIS MOL

Heilig Hart Ziekenhuis Mol vzw
Gasthuisstraat 1 – 2400 Mol
info@azmol.be
www.azmol.be
BE0409.925.265
RPR Turnhout

Deze brochure werd ontwikkeld door, en is eigendom van,
het H. Hartziekenhuis Mol.
Elke reproductie of verspreiding zonder toestemming van
de eigenaar is verboden.

Datum laatste aanpassing: 13 juni 2024
Naam auteur / verantwoordelijke: Dr. Van Ballaer / Dr. Naert
Kwalificaties auteur: Gynaecoloog / Kinderarts



H. HARTZIEKENHUIS
MOL

Algemeen nummer: 014 71 20 00

Afspraken: 014 71 20 53

Ombudsdienst: 014 71 21 93

Spoedgevallendienst: 014 71 23 92

Afspraken radiologie: 014 71 20 43